

# Médicaments contre-indiqués en cas de QT long

## Médicaments cardiovasculaires

Antiarythmiques de classe 1

*Contre-indiqués*

Quinidine (Cardioquine, Longacor, Quiniduruie, Sérécór)  
Disopyramide (Rythmodon, isorythm)

*Déconseillés*

Cibenzoline (Cipralan, Exacor)  
Fléccifnide (Flécdine)  
Propafénone (Rythmol)  
Aprindine (Fiboran)

Antiarythmiques de classe 111

*Contre-indiqués*

Amiodorone (Cordaroiie, Corbionax)  
Sotalol (Sotalex)

Inhibiteurs calciques

*Contre-indiqué* : Bépridil (Cordium)

Diurétiques

*Contre-indiqués* : tous les diurétiques hypokaliémions

Vasodilatateurs cérébraux

*Contre-indiqués* : les dérivés de la vincamine : Oxovinca, Pervincamine, Vinca, Vincafor, Vincimax, Rhéobroi, Rutovincine, Vincarutine

## Psychotropes

*Contre-indiqués*

Neuroleptiques : chlorpromazine (Largactil), dropéridol (Droleptan), halopéridol (Haldol), sultopride (Barnetil), thioridazine (Melleril), pimozide (Orap), rispéridone (Risperdal)  
Antidépresseurs : imipramine (Tofranil), désipramine (Pertofran), amitriptyline (Laroxyl, Élavil), doxépine (Quitaxon), maprotiline (Ludiomil)  
*Déconseillés* - tous les médicaments de la famille des phénothiazines, des butyrophénones, des benzamides, des imiprominiques, le lithium

## Anti-infectieux

*Contre-indiqués*

Érythromycine (Érythrocline, Abboticine, Biclar, Propiocrine, Éry, Éryphar)  
Spiramycine (Rovamycine, Rodogyl)  
Amphotéricine B (Fungizone, Amphocycline)  
Triméthoprime sulfaméthoxazole (Bactrim, Eusaprim)  
Amantadine (Mantadix)  
Pentamidine (Pentacarinat)  
Sparfloxacin (Zagam)  
Chloroquine (Nivaquine), halofantrine (Halfan)  
Azolés : kétoconazole (Nizorol), miconazole (Daktarin), itraconazole (Sporanox)

*Déconseillés* les médicaments de la classe des macrolides et les autres antipoludéens quinine (Quinimax, Quinoforme), méfloquine (Lorion), amodiaquine (Flavoquine)

## Anti-allergiques

*Contre-indiqué*

. Astémizole (Hismanal)

*Déconseillés*

Les autres antihistaminiques H1 non anticholinergiques : cétirizine (Zyrtec, Virlix), loratidine (Clarityne), oxatomide (Tinsset)  
Les antihistaminiques anticholinergiques : hydroxyzine (Atarax), cyproheptadine (Périactine), prométhazine (Phénergan), dexchlorphéniramine (Polaramine), alimémazine (Théralène), triprolidine (Actidilon), méfénidramium (Allerga), carbinoxamine (Allergefon), buclizine (Aphilan), bromphéniramine (Dimégan), méquitazine (Primalan), histapyrodine (Domistan), isothipendyl (Istamyl), doxylamine (Méré prine, Donormyl)

Les produits classés dans les «décongestionnants» qui contiennent des antihistaminiques, exemples : Actifed, Denoral, Bénadryl, Rinurel...

*Attention* aux associations entre les antihistaminiques et les dérivés azolés.

## Autres classes thérapeutiques

*Contre-indiqués* : le probucol (Lurselle), la doxorubicine (Adriblastine), le cisapride (Prepulsid)

*Déconseiller* l'Hexaquine et le Céquinyl qui contiennent de la quinine, les laxatifs irritants, notamment en association avec les dérivés **azolés**